


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «СибТрейд»
Мазоха Н.А.



ИНСТРУКЦИЯ
по применению Солвестана для снижения дефицита витамина K1 у
мелких домашних животных

(Организация-разработчик: ООО «СибТрейд», Россия)

I. Общие сведения

1. Солвестан – кормовая добавка для снижения дефицита витамина K1 у мелких домашних животных.
2. В 1 капсуле Солвестана содержится: 50 мг фитоменадиона (витамин K1) и вспомогательные компоненты до 1 г.
Солвестан выпускают в банках по 50 капсул.
3. Добавка представляет собой порошок от белого до светло желтого цвета.
4. Выпускают добавку в пакетах саше или капсулах по 1 г.
Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, принятых в Российской Федерации.

Каждую единицу фасовки маркируют на русском языке с указанием наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, ее состава и гарантированных показателей, срока и условий хранения, даты производства, массы нетто, номера партии, информации о соответствии, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в плотно закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 5 °C до 25 °C.

Срок годности – 3 года со дня производства.

Солвестан нельзя применять по истечении срока годности.

Утилизировать остатки неиспользованной добавки и тару следует в пункте сбора вредных и специальных отходов в соответствии с местным законодательством.

II. Биологические свойства

5. Гемостатическое средство, оказывает коагуляционное, антигеморрагическое действие. Принимает участие в биологическом синтезе факторов

свертывания крови II, VII, IX и X.

Устраняет явления передозировки антикоагулянтов кумаринового ряда, нормализует метаболизм и повышает свертываемость крови.

Участвует в синтезе АТФ и КФК тканей, активации АТФ-азы, КФК, некоторых аминотрансфераз, ферментов поджелудочной железы (амилазы, липазы), кишечника (энтерокиназы, ЩФ).

Витамин K1 – жирорастворимое вещество, прием которого улучшает параметры обмена веществ, свертываемость крови, состояние суставов, качество кожи и шерсти, эффективность циркуляции крови и работы кровеносной системы в целом. Для усиления эффекта при терапии сердечно - сосудистой системы и костной ткани принимать препарат можно в комбинации с витамином D, препаратами магния и кальция. Чтобы усилить противораковые свойства витамина K1, его нужно принимать одновременно с витамином C.

6. Применение добавки с кормом способствует снижению дефицита витамина K у мелких домашних животных.

III. Порядок применения

7. Соловестан применяют для снижения дефицита витамина K1 у мелких домашних животных, для профилактики гипопротромбинемии и геморрагического синдрома.

8. Кормовую добавку в профилактических целях применяют один раз в день в течение 21 дня в дозе 5 мг фитоменадиона на 1 кг массы животного или содержимое 1 капсулы (50 мг по фитоменадиону) на 10 кг. с кормом или лакомством. Профилактику рекомендовано проводить минимум 2 раза в год, при отсутствии провоцирующих условий по дефициту витамина K.

Для стимуляции роста и оздоровления шерсти у животного разово дают содержимое от 2 до 6 капсул, подмешивая в еду.

При отравлении непрямыми антикоагулянтами начальная доза для собак составляет 2,5 мг/кг каждые 12 часов в течение 2 дней, далее в той же дозе – 1 раз в день в течение 7 дней. Начальная доза для кошек – 5 мг/кг каждые 12 часов на протяжении 2-х суток, далее 5 мг/кг/день еще в течение 7 дней. Если отравляющее вещество принадлежит ко второму поколению антикоагулянтных родентицидов (Бродифакум, Бромадиолон) или конкретное действующее вещество неизвестно, следует продолжить прием препарата после стабилизации еще в течение 6-8 недель в дозировке 1–2,5 мг/кг 1 раз в 7 дней.

Расчетные дозы в капсулах составляют:

менее 2,5 кг – содержимое $\frac{1}{4}$ капсулы; от 2,5 до 5 кг – содержимое $\frac{1}{2}$ капсулы; от 5 до 7,5 кг – содержимое $\frac{3}{4}$ капсулы; от 7,5 до 10 кг – содержимое 1 капсулы. Для собак, вес которых выше 10 кг, рекомендуется к содержимому 1 капсулы добавлять по $\frac{1}{4}$ на каждые 2,5 кг.

Применяют с кормом или лакомством.

9. Побочных явлений и осложнений при применении в соответствии с

инструкцией не выявлено.

Возможна индивидуальная непереносимость.

10. Совместим с другими кормовыми добавками. Салицилаты (НПВС) и цефалоспорины, содержащие N-метил-тиотетразольную группу, снижают действия витамина K1.

11. Несовместим с цианокобаламином (B12).

IV. Меры личной профилактики

12. При работе с Солвестаном необходимо соблюдать правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками для животных. Людям с гиперчувствительностью к фитоменадиону следует избегать контакта с кормовой добавкой. После работы с кормовой добавкой необходимо помыть руки.

13. При попадании добавки в глаза – промыть проточной водой в течение 15 минут; при попадании на кожу – промыть водой с мылом; при вдыхании – вывести на свежий воздух, обратиться к врачу; при проглатывании – обратиться к врачу.

14. Кормовую добавку следует хранить в недоступном для детей месте.

15. Организация-разработчик:

ООО «СибТрейд», Россия, 644033, Омская обл., г. Омск, ул. Кольцевая 2-я, 15/9.

16. Адрес места производства:

ООО «ВИК – здоровье животных», Россия,

308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт. Северный, ул. Березовая, зд. 1/16, корп. 15.

Регистрационный номер: РК-ВП-3-2732-14