

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ
02.12.2016

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Фортразин-ЕВРTM с лечебно-профилактической целью при
желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии у
сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, и пушных зверей

(организация-разработчик: «ЕВРОБИОФАРМ ГмбХ» Постштрассе 25, 20354
Гамбург, Германия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Фортразин-ЕВРTM
100 и 150 (FortraZin-EVRTM 100; 150).

Международное непатентованное наименование: бацитрацин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Фортразин-ЕВРTM 100 и 150 в качестве действующего вещества в 1 г
содержит цинк бацитрацин – 100 мг или 150 мг и вспомогательные вещества
соевую муку, кукурузную муку и кальция карбонат.

3. По внешнему виду препарат представляет собой микрогранулированный
порошок желто-коричневого цвета.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения в закрытой
упаковке производителя – 2 года с даты производства.

Запрещается применять препарат по истечении срока годности.

4. Препарат выпускают расфасованным по 20 и 25 кг в бумажные мешки с
внутренним полиэтиленовым покрытием. Каждую потребительскую упаковку
снабжают инструкцией по применению препарата.

5. Фортразин-ЕВРTM 100 и 150 хранят в закрытой упаковке производителя,
в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от пищевых
продуктов и кормов, при температуре от 0 °C до 25 °C.

6. Фортразин-ЕВРTM 100 и 150 следует хранить в местах, недоступных для
детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.
8. Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II.Фармакологические свойства

9. Фортразин-ЕВР™ 100 и 150 относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы полипептидных антибиотиков.

10. Цинк бацитрацин, входящий в состав лекарственного препарата, продуцируется *Bacillus licheniformis*, активен главным образом в отношении грамположительных микроорганизмов, включая *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp. и *Clostridium* spp., практически не действует на грамотрицательные микроорганизмы, не изменяет чувствительность кишечных грамотрицательных микроорганизмов к другим противомикробным средствам.

Механизм действия препарата заключается в подавлении роста и развития микроорганизмов за счет ингибирования процессов образования клеточных стенок и синтеза клеточного белка, в результате в организме животных активизируются пищеварительные и обменные процессы.

Цинк бацитрацин практически не всасывается в желудочно-кишечном тракте и не накапливается в органах и тканях животных, выводится из организма главным образом в неизмененном виде с фекалиями.

Фортразин-ЕВР™ 100 и 150 по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

11. Фортразин-ЕВР™ 100 и 150 назначают молодняку сельскохозяйственных животных, свиньям, крупному и мелкому рогатому скоту на откорме, сельскохозяйственным птицам и пушным зверям с лечебно-профилактической целью при желудочно-кишечных заболеваниях бактериальной этиологии, возбудители которых чувствительны к бацитрацину.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животных, в том числе птиц, к компонентам препарата. Запрещается применение Фортразин-ЕВР™ 100 и 150 племенным животным (включая птиц), курам-несушкам, ремонтному молодняку кур

старше 16-недельного возраста и дойному скоту, яйца и молоко от которых будут использоваться в пищевых целях.

13. Фортразин-ЕВР™ 100 и 150 применяют животным групповым способом в смеси с кормом в следующих дозах:

Вид и возраст животных	Фортразин-ЕВР™ 100 и 150 (г на 1 т корма)	
	цинк бацитрацин 10%	цинк бацитрацин 15%
Телята, ягнята, козлята, поросыта до 6-месячного возраста	900-1000	600-660
Свиньи, крупный и мелкий рогатый скот на откорме	750-850	500-570
Птицы	500-1000	330-660
Пушные звери	500-1000	330-660

Продолжительность курса применения:

- молодняк сельскохозяйственных животных, свиньи, крупный и мелкий рогатый скот на откорме и пушные звери: не более 14 дней;
- ремонтный молодняк кур: до 16-недельного возраста;
- бройлеры: до конца производственного цикла, исключая из рациона за 24 часа до убоя.

Для обеспечения равномерного распределения препарата в корме используют ступенчатое смешивание. С этой целью рекомендуемую дозу препарата последовательно смешивают с 10 кг, 90 кг, а затем с 900 кг корма.

14. При передозировке препарата у животных может наблюдаться снижение аппетита и уменьшение привесов.

15. Особеностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Препарат не рекомендуется применять племенным животным.

17. При пропуске одной или нескольких доз лекарственного препарата курс применения необходимо возобновить как можно скорее в той же дозе и по той же схеме.

18. При применении Фортразина-EBPTM 100 и 150 в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.

19. Сведения о взаимодействии Фортразин-EBPTM 100 и 150 с лекарственными препаратами других фармакологических групп и кормовыми добавками, применяемыми в птицеводстве и животноводстве, отсутствуют.

20. Убой свиней, крупного и мелкого рогатого скота на мясо, разрешается не ранее, чем через 6 суток, птиц – не ранее чем через 24 часа после последнего применения препарата. Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

21. При применении препарата следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. По окончании работы следует вымыть руки теплой водой с мылом.

22. К работе с препаратом не допускаются лица с признаками аллергических, респираторных, желудочно-кишечных заболеваний или кожных поражений.

23. При попадании препарата на кожу или слизистые оболочки необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

Наименования и адреса производителя
лекарственного препарата для
ветеринарного применения.

«Евробиофарм Чайна Ко., Лтд»
Рум 1609 Б Блок. Голден Бридж,
Интернейшнл Плаза, № 50 Кэжи Роад,
Кси'ан, Китай.

Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя.

ООО «Торговый дом-ВИК»,
Россия, 140051, Московская область,
Люберецкий район, пос. Красково,
Егорьевское шоссе, д. 3А, оф. 33.

Инструкция разработана по применению препарата Фортразин-ЕВРTM разработана «ЕВРОБИОФАРМ ГмбХ», Германия.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Фортразина-ЕВРTM, утвержденная Россельхознадзором 16.01.2015 г.

Номер регистрационного удостоверения: 276-3-1316-3495 ЗТБУ-3-51/03423