

СОГЛАСОВАНО

Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ

12.02.2019



## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата  
Соладокси® 500

(Организация-разработчик: ООО «ВИК – здоровье животных»,  
Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы,  
дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А, офис 34)

Номер регистрационного удостоверения: 32-3-14.18-4425/170P-3-29.13/02903

### I. Общие сведения

1. Наименование лекарственного препарата для ветеринарного применения: Соладокси® 500 (Soladoxy 500).

Международное непатентованное наименование: доксициклин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

Соладокси® 500 содержит в 1 г в качестве действующего вещества доксициклина гиклат – 500 мг, а в качестве вспомогательных веществ – кислоту винную, кислоту аскорбиновую, натрия метабисульфит и трилон Б.

3. По внешнему виду Соладокси® 500 представляет собой порошок желтого цвета.

Срок годности Соладокси® 500 в закрытой упаковке производителя при соблюдении условий хранения – 3 года со дня производства.

Запрещается применять Соладокси® 500 по истечении срока годности.

4. Соладокси® 500 выпускают расфасованным по 500 г и 1 кг в пакеты из бумаги с полиэтиленовым покрытием или в двойные пакеты из полиэтиленовой пленки, или в пакеты из ламинированной фольги или из металлизированной полиэтиленовой пленки; по 5 и 10 кг в ведра полимерные соответствующей вместимости. Каждая потребительская упаковка препарата сопровождается инструкцией по применению.

5. Соладокси® 500 хранят в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0 °С до 25 °С и относительной влажности не выше 60%.

Допускается кратковременное (до 30 суток) транспортирование препарата при температуре от минус 20 °С до 40 °С всеми видами транспортных средств, обеспечивающих целостность упаковочной тары.

6. Соладокси® 500 следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

## II. Фармакологические свойства

9. Соладокси® 500 относится к лекарственным средствам фармакотерапевтической группы тетрациклинов.

10. Доксициклина гиклат является полусинтетическим антибиотиком тетрациклинового ряда, обладает широким спектром антибактериального действия в отношении многих грамположительных (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Actinomyces* spp., *Clostridium* spp., *Bacillus anthracis*, *Corynebacterium* spp., *Erysipelothrix* spp., *Listeria* spp.) и грамотрицательных (*Haemophilus influenzae*, *Haemophilus parasuis*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella* spp., *Brucella* spp., *Bartonella* spp., *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Campylobacter* spp.) микроорганизмов, а также микоплазм (*M. synoviae*, *M. hyopneumoniae*, *M. hyorhinis*, *M. hyosynoviae*), спирохет, хламидий и риккетсий. Доксициклин, действуя бактериостатически, ингибирует синтез протеинов в микробной клетке, нарушая связь транспортной аминоксил-РНК с 30S субъединицей рибосомальной мембраны.

После орального применения препарата доксициклин хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте животных и проникает во все органы и ткани организма, где достигает максимальных концентраций уже через 2-4 часа после введения, и сохраняется на терапевтическом уровне на протяжении 18-20 часов.

Доксициклин выводится из организма животных преимущественно с желчью.

Соладокси® 500 по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

## III. Порядок применения

11. Соладокси® 500 применяют с лечебной и лечебно-профилактической целью при респираторных и желудочно-кишечных инфекциях бактериальной этиологии у телят, ягнят, козлят, свиней и сельскохозяйственной птицы, вызванных чувствительными к доксициклину микроорганизмами.

12. Противопоказанием к применению Соладокси® 500 является повышенная индивидуальная чувствительность животного к тетрациклинам.

Запрещается применять препарат животным с развитым рубцовым пищеварением, с выраженной функциональной недостаточностью печени и по-

чек, а также, в связи с накоплением доксициклина в яйцах, курам-несушкам и ремонтному молодняку кур старше 16-недельного возраста.

13. При работе с Соладокси® 500 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Работу с препаратом следует проводить в спецодежде с использованием средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки, маска или респиратор). При работе с препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы с лекарственным препаратом руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Людам с гиперчувствительностью к тетрациклинам следует избегать прямого контакта с Соладокси® 500.

Пустую тару из-под Соладокси® 500 запрещается использовать для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

При случайном попадании препарата на кожу его необходимо немедленно смыть водой с мылом, при попадании в глаза – промыть их в течение нескольких минут большим количеством проточной воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека необходимо немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению или этикетку).

14. Запрещается применение препарата беременным и лактирующим животным.

15. Соладокси® 500 применяют с водой для поения в течение 3-5 суток:

- телятам, ягнятам и козлятам – индивидуально два раза в сутки по 0,1 г препарата на 10 кг массы животного, что соответствует 5 мг доксициклина на 1 кг массы животного;

- свиньям и сельскохозяйственной птице – групповым способом в суточной дозе 100 г препарата на 500-1000 л воды.

В период лечения свиньи и птица должны получать только воду, содержащую лекарственный препарат. Раствор Соладокси® 500 готовят ежедневно из расчета потребности животных и птиц в воде в течение суток.

Возможно выпаивание раствора препарата в суточной дозе методом пульсдозинга в течение 4-6 часов.

16. Побочных явлений и осложнений при применении лекарственного препарата в соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к тетрациклинам и возникновении аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

17. При передозировке препарата у животных может наблюдаться нарушение функции желудочно-кишечного тракта, снижение потребления корма.

18. Не допускается одновременное применение Соладокси® 500 с бактерицидными антибиотиками, минеральными добавками и лекарственными

препаратами, содержащими соли кальция, магния, железа и алюминия (из-за возможного снижения всасывания антибиотика).

19. Особенности действия при первом применении и при отмене лекарственного препарата не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы лекарственного препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

21. Убой телят, ягнят и козлят на мясо разрешается не ранее, чем через 14 суток, свиней – не ранее, чем через 8 суток, а птицы – не ранее, чем через 7 суток после последнего применения Соладокси® 500. Мясо животных и птиц, вынуждено убитых до истечения указанных сроков, может быть использовано для кормления пушных зверей.

Наименования и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения

1. ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт Северный, ул. Березовая, зд. 1/16, корп. 15 (полный производственный цикл)

2. ООО «НПФ ВИК», Россия, 308519, Белгородская обл., Белгородский р-н, пгт Северный, ул. Березовая, зд. 1/16 (полный производственный цикл)

Наименование и адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя

ООО «ВИК – здоровье животных», Россия, 140050, Московская область, г.о. Люберцы, дачный поселок Красково, Егорьевское шоссе, д. 3А, офис 34

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Соладокси® 500, согласованная Россельхознадзором 20 марта 2018 года.